



Cutasept® F

Haut-Antiseptikum für Stations- und Praxisbereiche

- wirkt schnell und umfassend
- ausgezeichnet hautverträglich
- besonders wirtschaftlich durch Applikationshilfen

Wirkstoffe

2-Propanol (63 g),
Benzalkoniumchlorid (0,025 g).



Wirkungsspektrum

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend (HBV, HIV, Herpes simplex-Virus Typ 1, Rotaviren).

Listung

BfArM Reg.-Nr. C 1192, DGHM

Anwendungsbereiche

Im stationären, ambulanten und niedergelassenen Bereich zur Haut-Desinfektion vor Injektionen und Blutentnahmen, vor Punktionen, kleinen medizinischen Eingriffen, Katheterisierungen, bei Unfall- und Bagatellverletzungen. Im OP-Bereich zur prä- und postoperativen Haut-Desinfektion.

Dosierung

Geprüft nach DGHM-Richtlinie zur Hautdesinfektion

Anwendung an talgdrüsenarmer Haut:	
vor Punktionen und Injektionen	mind. 15 Sek.
vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen	mind. 1 Min.
Anwendung an talgdrüsenreicher Haut:	
vor allen Eingriffen	mind. 10 Min.

Hinweis

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise für alkoholische Desinfektionsmittel

Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Anwendungshinweise und Sicherheitsregeln für alkoholische Desinfektionsmittel beachten.

Cutasept F: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%, Benzalkoniumchlorid 0,025 g. Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. **Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Warnhinweise: Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21°C. Entzündlich.